

BỘ MÔN SẢN

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

TÌNH HUỐNG LÂM SÀNG SẢN PHỤ KHOA

LƯU HÀNH NỘI BỘ

2020

Tình huống lâm sàng số 1.

Bệnh nhân nữ 26 tuổi, tiền căn PARA 0000, đến khoa cấp cứu vì đau trần bụng dưới và ra huyết âm đạo. Kỳ kinh cuối của bệnh nhân là 8 tuần trước và test thử thai dương tính. Thăm khám lâm sàng ghi nhận, bệnh nhân có nhịp tim nhanh, chân tay lạnh, huyết áp tụt, đề kháng thành bụng, siêu âm bụng tại giường thấy có dịch ổ bụng. Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ cấp cứu để thám sát và xử trí nguyên nhân.

Câu 1. Chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thai ngoài tử cung vỡ
- B. Thai trứng bán phần
- C. Sảy thai không trọn
- D. U nang buồng trứng xoắn

Câu 2. Các cận lâm sàng nào cần làm tiếp tục trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Đông cầm máu
- B. X-quang vùng chậu hông
- C. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi
- D. Điện giải đồ

Câu 3. Chỉ định ngoại khoa nào phù hợp trên bệnh nhân trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Cắt bỏ vòi tử cung đến sát góc tử cung
- B. Xẻ vòi trứng bảo tồn
- C. Cắt tử cung bán phần

D. Cắt toàn bộ tử cung

Câu 4. Nếu quyết định điều trị ngoại khoa bảo tồn trên bệnh nhân này sau khi đã phẫu thuật ổn định thì cần theo dõi nồng độ β -hCG bao lâu? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 12h
- B. 24h
- C. 48h
- D. 72h

Câu 5. Nếu β -hCG sau mổ 3 ngày trên bệnh nhân này giảm ít hơn 20% so với β -hCG trước mổ thì được xem là sót tế bào nuôi. Trường hợp này, chúng ta sẽ tư vấn điều trị như thế nào? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Định lượng β -hCG hàng tuần cho đến khi âm tính
- B. Điều trị MTX đơn liều 50mg tiêm bắp
- C. Phẫu thuật lần 2 nạo bỏ tế bào nuôi
- D. Điều trị Oxytocin liều cao để tổng nôt phần tế bào nuôi còn lại

Tình huống lâm sàng số 2.

Bệnh nhân nữ 42 tuổi, PARA 2002, vào viện vì ra huyết rỉ rả từ âm đạo và đau bụng vùng hạ vị. Khi được hỏi về kỳ kinh cuối thì bệnh nhân không nhớ rõ, nhưng độ khoảng 7 tuần trước. Qua thăm khám lâm sàng ghi nhận: đau bụng khi khám, có khối u cạnh tử cung mềm, di động. Test thử thai nhanh bằng que Dipstick (+). Bệnh nhân không nôn, không buồn nôn, không bí trung đại tiện.

Câu 1. Chẩn đoán sơ bộ nghi nhiều nhất trên bệnh nhân này là gì? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Sảy thai không trọn
- B. U xơ tử cung thoái hoá
- C. Thai ngoài tử cung
- D. U lạc nội mạc tử cung

Câu 2. Các cận lâm sàng có thể thực hiện trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Định lượng β -hCG huyết thanh
- A. Định lượng progesterone
- B. Siêu âm
- C. Soi ổ bụng

Câu 3. Vài giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân được tiến hành thực hiện các cận lâm sàng với kết quả như sau: β -hCG = 2898 mIU/mL, Progesterone = 4 ng/mL, khối thai # 2 cm, dịch ổ bụng = 40 mL. Anh/chị hãy đánh giá tỉ lệ điều trị nội khoa thành công trên bệnh nhân này theo bảng điểm Fernandez (1991)? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 7 điểm
- B. 9 điểm
- C. 12 điểm
- D. 13 điểm

Câu 4. Mục tiêu điều trị bệnh căn của bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Giải quyết khối thai lạc chỗ
- B. Giảm tối thiểu tỷ lệ tử vong
- C. Ngừa tái phát thai lạc chỗ
- D. Hạn chế tối đa khả năng sinh sản cho người phụ nữ

Câu 5. Để siêu âm bằng đầu dò âm đạo mà thấy được túi thai thì nồng độ β -hCG huyết thanh phải đạt bao nhiêu? *Chọn câu đúng nhất:*

- B. β -hCG > 500 mIU/mL
- C. β -hCG > 1500 mIU/mL
- D. β -hCG > 3000 mIU/mL
- E. β -hCG > 6500 mIU/mL

Tình huống lâm sàng số 3.

Bệnh nhân nữ 33 tuổi, PARA 1001, thể trạng trung bình, da niêm hồng vào viện vì ra huyết âm đạo lượng ít. Kỳ kinh cuối là 7 tuần trước. Khám lâm sàng ghi nhận: bệnh nhân nôn, bí trung đại tiện, sờ bụng cảm giác các phần thai ở nông ngay dưới da bụng, không có cơn co tử cung. Khám âm đạo thấy tử cung kích thước bình thường. Tiền căn: sanh thường, con lần đầu sanh dễ.

Câu 1. Chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh nhân này? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang buồng trứng cơ năng
- B. Thai ngoài tử cung chưa vỡ
- C. Thai trứng toàn phần
- D. Nhau bong non

Câu 2. Các cận lâm sàng có thể được tiến hành trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Siêu âm
- B. X-quang bụng không chuẩn bị
- C. Định lượng β -hCG huyết thanh
- D. Chụp cắt lớp vi tính

Câu 3. Hướng xử trí thích hợp nhất cho bệnh nhân trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Mổ lấy thai ngay, tránh biến chứng đông máu
- B. Mổ khi thai đạt 37 tuần
- C. Theo dõi, mổ trì hoãn
- D. Dùng MTX liều 50 mg/m² da trong lần đầu

Câu 4. Tiên lượng sau điều trị cho bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Khoảng 5% các trường hợp có thể mang thai lại bình thường
- B. Tỷ lệ tái phát thai ngoài tử cung ở những lần có thai sau là 80%
- C. 100% vô sinh sau khi mổ thai ngoài tử cung
- D. Nếu chẩn đoán muộn, xử trí không kịp thời tỷ lệ tử vong là 1 – 1,5%

Câu 5. Loại thuốc nào được sử dụng để trung hoà tác dụng độc hại của MTX?

Chọn nhiều câu đúng:

- A. Leucovorin
- B. Acid folic
- C. Oxytocin
- D. Progesterone

Tình huống lâm sàng số 4.

Bệnh nhân nữ 38 tuổi, PARA 2002, vào viện vì ra huyết âm đạo bất thường và đau bụng lâm râm vùng hạ vị. Kỳ kinh cuối trước đó là 8 tuần. Bệnh nhân được cho nằm nghỉ ngơi. Khám lâm sàng ghi nhận: đau khi khám bụng. Sau đó, bệnh nhân thử β -hCG nước tiểu (+). Bác sĩ chỉ định bệnh nhân siêu âm ghi nhận: phần phụ hai bên bình thường, đường kính trước sau tử cung lớn hơn bình thường # 43mm, buồng tử cung không có túi thai, nội mạc tử cung dày # 12mm, ống cổ tử

cung không có túi thai, mặt trước tử cung có túi thai bờ dày. Tiền sử: bé gái đầu sinh thường, bé trai sau sinh mổ, vết mổ từng bị nhiễm trùng.

Câu 1. Chẩn đoán nào hợp lý nhất trên bệnh nhân trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thai ngoài tử cung nằm trong ổ bụng
- B. Thai ngoài tử cung ở vòi trứng
- C. Thai ngoài tử cung bám trên vết mổ cũ
- D. Thai ngoài tử cung ở buồng trứng

Câu 2. Đối với trường hợp bệnh nhân trên nói riêng và những trường hợp nghi ngờ thai ngoài tử cung nói chung thì những cận lâm sàng nào cần được thực hiện đầu tiên nhất? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Siêu âm
- B. Thử β -hCG nước tiểu
- C. Định lượng β -hCG huyết thanh
- D. Nội soi ổ bụng

Câu 3. Những biện pháp xử trí có thể áp dụng trên bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Huỷ thai trong túi ối
- B. Nong nạo
- C. Hoá trị liệu MTX
- D. Thất động mạch hạ vị

Câu 4. Bộ bilan xét nghiệm trước khi quyết định điều trị MTX đối với bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Huyết đồ, nhóm máu, rheus
- B. Chức năng gan, thận
- C. Đông cầm máu
- D. Bilan mỡ máu

Câu 5. Vài giờ sau, bệnh nhân có kết quả cận lâm sàng như sau:

β -hCG 3000 mIU/mL; Hình ảnh siêu âm có túi thai bờ dày; Kích thước khối thai # 2,2 cm; Siêu âm Doppler có nguy cơ trung bình.

Hãy đánh giá tỉ lệ thành công khi điều trị MTX đơn liều ở bệnh nhân trên theo bảng điểm Elito (1999) với tổng điểm là bao nhiêu? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 3 điểm
- B. 5 điểm
- C. 6 điểm
- D. 8 điểm

Tình huống lâm sàng số 5.

Bệnh nhân nữ 42 tuổi, PARA 2012, vào viện vì ra huyết lượng ít từ âm đạo và đau bụng hạ vị. Khi được hỏi về kỳ kinh cuối thì bệnh nhân không nhớ rõ, nhưng độ khoảng 8 tuần trước. Qua thăm khám lâm sàng ghi nhận: đau bụng liên tục khi khám nhưng mức độ đau không nhiều, có khối u cạnh tử cung mềm, di động. Test thử thai nhanh bằng que Quickstick (+). Bệnh nhân không nôn, không buồn nôn, không bí trung đại tiện.

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết chẩn đoán nào phù hợp trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thai trứng toàn phần

- B. U nang buồng trứng
- C. Thai ngoài tử cung
- D. U xơ tử cung có cuống

Câu 2. Vài giờ sau khi nhập viện, bệnh nhân được tiến hành thực hiện các cận lâm sàng với kết quả như sau: β -hCG = 6000 mIU/mL, Progesterone = 8 ng/mL, khối thai # 3,5 cm, dịch ổ bụng = 110 mL. Anh/chị hãy đánh giá tỉ lệ điều trị nội khoa thành công trên bệnh nhân này theo bảng điểm Fernandez (1991) với tổng điểm? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 8 điểm
- B. 11 điểm
- C. 14 điểm
- D. 16 điểm

Câu 3. Để siêu âm bụng mà thấy được túi thai thì nồng độ β -hCG huyết thanh phải đạt bao nhiêu? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. β -hCG > 500 mIU/mL
- B. β -hCG > 1500 mIU/mL
- C. β -hCG > 3000 mIU/mL
- D. β -hCG > 6500 mIU/mL

Câu 4. Trong vài thập niên gần đây, cho dù có nhiều tiến bộ trong việc chẩn đoán sớm nhưng thai ngoài tử cung vẫn là bệnh lý ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai sản khoa của người phụ nữ. Vậy xuất độ thai ngoài tử cung so với thai kỳ tự nhiên chiếm tỉ lệ? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 1:30

- B. 1:80
- C. 1:100
- D. 1:500

Câu 5. Tam chứng lâm sàng cổ điển bệnh căn của bệnh nhân trên phù hợp với những triệu chứng nào sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Trễ kinh
- B. Cường kinh
- C. Ra máu âm đạo
- D. Đau hạ vị

Tình huống lâm sàng số 6.

Bệnh nhân nữ 36 tuổi, PARA 1102, thể trạng trung bình, da niêm hồng vào viện vì ra huyết âm đạo lượng rỉ rả. Kỳ kinh cuối là 8 tuần trước. Khám lâm sàng ghi nhận: bệnh nhân nôn, bí trung đại tiện, sờ bụng cảm giác các phần thai ở nông ngay dưới da bụng, không có cơn co tử cung và đau vai trái. Khám âm đạo thấy tử cung kích thước bình thường, không có thai trong tử cung. Siêu âm: có dịch ở cùng đồ. Tiền căn: sanh thường, con lần đầu sanh dễ, con lần hai sanh non 36 tuần.

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết chẩn đoán nào phù hợp nhất? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thai ngoài tử cung nằm trong ổ bụng
- B. Thai ngoài tử cung ở vòi trứng
- C. Thai ngoài tử cung bám trên vết mổ cũ
- D. Thai ngoài tử cung ở buồng trứng

Câu 2. Trên bệnh bệnh nhân, ngoài đau bụng nhiều, ra huyết âm đạo, bí trung đại tiện thì còn có triệu chứng đau vai trái. Vậy đau vai trái trong trường hợp này do lượng dịch tự do trong ổ bụng kích thích? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Dây thần kinh chậu hông
- B. Dây thần kinh hoành
- C. Dây thần kinh lang thang
- D. Dây thần kinh quặt ngược

Câu 3. Chẩn đoán phân biệt nào phù hợp trên bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. U xơ tử cung
- B. U nang buồng trứng
- C. Vỡ tử cung có sẹo mổ cũ
- D. Viêm tụy cấp

Câu 4. Để tiến hành điều trị bằng MTX cho bệnh nhân trên thì phải thoả mãn các điều kiện sau? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Huyết động học ổn định
- B. Thai ngoài tử cung vỡ
- C. β -hCG huyết thanh < 1000 mIU/mL
- D. Kích thước khối thai $< 3,5$ cm và có tim thai

Câu 5. Vai trò trong điều trị thai ngoài tử cung bằng Methotrexate (MTX) đang được ưu tiên hàng đầu vì MTX là chất đối vận với acid folic do có tác dụng? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Kích thích tổng hợp DNA của tế bào nuôi

- B. Ức chế tổng hợp DNA của tế bào nuôi
- C. Kích thích tổng hợp RNA của tế bào nuôi
- D. Ức chế tổng hợp RNA của tế bào nuôi

Tình huống lâm sàng số 7.

Cô Dương Thị H, 30 tuổi, PARA 1001. Tiền căn: 4 năm trước, cô H từng phẫu thuật bóc nang lạc nội mạc tử cung ở buồng trứng (T). 2 năm sau, chu kỳ kinh cô H ngắn dần, hiện còn 21-23 ngày. Cô H đi khám phụ khoa, kết quả siêu âm ngày 3 của chu kỳ có 1 nang noãn 15mm và có hiện tượng phóng noãn vào ngày thứ 9 của thai kỳ. Cô H được bệnh viện T.D chỉ định làm định lượng nội tiết tố để chẩn đoán và quyết định điều trị chuyên biệt.

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết kết quả nội tiết tố của của cô H so với nội tiết tố của một người phụ nữ bình thường? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nồng độ estrogen huyết thanh tăng hơn
- B. Nồng độ prolactin huyết thanh tăng hơn
- C. Nồng độ AMH huyết thanh tăng hơn
- D. Nồng độ progesterone không đổi

Câu 2. Nồng độ Anti-Mullerian Hormone phản ánh điều gì trên bệnh nhân trên?

Chọn câu đúng nhất:

- A. Tổng số nang noãn nói chung tại buồng trứng
- B. Tổng số nang nguyên thủy tại buồng trứng
- C. Tổng số nang thứ cấp muộn tại buồng trứng
- D. Tổng số nang noãn thoái triển tại buồng trứng

Câu 3. Tiêu chuẩn vàng chẩn đoán lạc nội mạc tử cung ở bệnh nhân trên? *Chọn câu đúng nhất*

- A. Siêu âm
- B. MRI
- C. CA125
- D. Nội soi ổ bụng

Câu 4. Mục tiêu điều trị ở bệnh nhân trên cho đến thời điểm hiện tại? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Giảm đau
- B. Bảo tồn khả năng sinh sản
- C. Giảm tái phát và biến chứng nặng
- D. Ngoại khoa tối thiểu

Câu 5. Điều trị nội khoa ở bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Kháng viêm không steroid
- B. Liệu pháp progestin
- C. Thuốc viên ngừa thai kết hợp
- D. GnRH đồng vận

Tình huống lâm sàng số 8.

Bà Trương Thị M, 50 tuổi, PARA 2002, mãn kinh đã 2 năm đến khám vì tiết dịch âm đạo nhiều, hôi như mùi tanh cá (đặc biệt sau giao hợp) khoảng 1 tuần nay. Khám: âm đạo màu tái nhợt, không nếp gấp, có dịch trong loãng nhiều. Pap's test bình thường.

Câu 1. Chẩn đoán sơ bộ phù hợp nhất trên bệnh nhân trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nhiễm khuẩn âm đạo
- B. Viêm vùng chậu
- C. Áp xe phần phụ
- D. Viêm âm đạo do thiếu nội tiết

Câu 2. Cận lâm sàng cần thực hiện tiếp theo trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Sinh thiết
- B. Whiff test
- C. Nhuộm Gram huyết trắng
- D. CT-scan vùng chậu

Câu 3. Kết quả cận lâm sàng như sau:

- Whiff test (+)
- Nhuộm Gram huyết trắng: có ít vi khuẩn gram âm, không có Lactobacillus, không có tế bào biểu biểu mô lát, không có bạch cầu, nhiều “Blue cells”
- Pap’s test bình thường

Anh/chị nghĩ nhiều nhất tác nhân gây bệnh cho bà M? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Trực khuẩn Doderline
- B. Vi khuẩn Gardnerella vaginalis
- C. Candida albicans
- D. Neisseria gonorrhoeae

Câu 4. Điều trị nội khoa nào phù hợp cho bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Metronidazole 500mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống)

- B. Clindamycin 300mg x 2 lần/ngày x 7 ngày (uống)
- C. Policresulen 90mg x 1 lần/ngày x 6 ngày (uống)
- D. Dequalinium clorid 10mg x 1 lần/ngày x 6 ngày (đặt âm đạo)

Câu 5. Nhiễm khuẩn âm đạo là một hội chứng rối loạn phổ vi trùng âm đạo do sự giảm sút nồng độ? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. FSH và LH trong huyết thanh
- B. Lactobacilli
- C. Vi khuẩn yếm khí
- D. Miễn dịch trong cơ thể

Tình huống lâm sàng số 9.

Cô Dương Hoàng Y, 33 tuổi, PARA 2002 đến bệnh viện khám vì ngứa âm hộ và âm đạo nhiều khoảng 2 tuần nay, đôi lúc có cảm giác nóng và đau khi giao hợp.

Khám: niêm mạc âm đạo viêm đỏ, huyết trắng không hôi, đục, đặc, lợn cợn thành mảng giống như sữa đông, vàng sữa, thành mảng dày dính vào thành âm đạo và ở dưới có vết trợt đỏ. Ngoài ra, bệnh nhân không sốt, không đau cơ

Câu 1. Chẩn đoán sơ bộ nghi nhiều trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Viêm đạo do Trichomonas
- B. Viêm âm đạo do thiếu nội tiết
- C. Viêm vùng chậu
- D. Viêm âm đạo do nấm

Câu 2. Các cận lâm sàng cần được tiến hành trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Soi tươi
- B. Nhuộm gram
- C. Whiff test
- D. Đo pH

Câu 3. Kết quả các cận lâm sàng như sau:

- Đo pH < 4,5
- Whiff test (-), không có “Clue cell”
- Nhuộm Gram: không có bạch cầu
- Soi tươi: không thấy tế bào trung gian, có sợi tơ

Từ dữ kiện các cận lâm sàng trên, anh/chị hãy cho biết chẩn đoán xác định trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Viêm đạo do Trichomonas
- B. Viêm âm đạo do thiếu nội tiết
- C. Viêm vùng chậu
- D. Viêm âm đạo do nấm

Câu 4. Hướng điều trị nội khoa phù hợp với bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Nystatin 500.000 IU đặt âm đạo 1 viên/ngày x 14 ngày
- B. Fluconazole 150mg uống 1 viên duy nhất
- C. Clotrimazol 1% uống 2 viên/ngày x 3 ngày
- D. Povidon iodin 10% rửa âm hộ

Câu 5. Tỷ lệ phần trăm phụ nữ mắc bệnh căn ở bệnh nhân trên 1 lần trong đời là bao nhiêu? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%

Tình huống lâm sàng số 10.

Chị Võ Thị Thu B, 25 tuổi, PARA 0000, hoạt động tình dục mạnh, đến phòng khám tư nhân chuyên khoa phụ khoa với lý do ngứa âm hộ và âm đạo, đi tiểu khó, đau khi giao hợp. Khám âm đạo ghi nhận: huyết trắng nhiều, loãng, hôi, có bọt và có mùi tanh, đặc biệt có dấu hiệu trái dây tây. Bệnh nhân được chỉ định soi tươi và quan sát được trên vi trường hình ảnh hạt chanh đang di động và có bạch cầu.

Câu 1. Chẩn đoán nào phù hợp nhất trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Viêm âm đạo do nấm
- B. Viêm âm đạo do trùng roi
- C. Nhiễm khuẩn âm đạo
- D. Viêm âm đạo do giang mai

Câu 2. Hướng xử trí phù hợp trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Không có chỉ định điều trị
- B. Metronidazol 500mg x 2 lần/ngày x 7 ngày
- C. Estrone liều thấp đặt âm đạo dài ngày
- D. Metronidazol 2 g đặt âm đạo liều duy nhất

Câu 3. Viêm âm đạo do tác nhân ở trên bệnh nhân thường gặp nhất là? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. *Candida albicans*
- B. *Trichomonas vaginalis*
- C. *Treponema pallium*
- D. *Chlamydia trachomatis*

Câu 4. Những lưu ý gì khi điều trị cho bệnh nhân trên? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Phải điều trị cho người phối ngẫu
- B. Metronidazol 2g uống liều duy nhất
- C. Metronidazol an toàn trong 3 tháng đầu thai kỳ
- D. Có thể uống rượu khi đang dùng metronidazole

Câu 5. Đặc điểm huyết trắng trong bệnh lý của bệnh nhân trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nhầy lẫn mũ
- B. Loãng, có bọt
- C. Đặc dính như hồ
- D. Xanh lẫn mũ, máu

Tình huống lâm sàng số 11.

Anh P, 30 tuổi và chị H, 26 tuổi, đến khám vì lập gia đình đã 3 năm mà vẫn chưa có thai. Họ được khám lâm sàng tổng quát và sàng lọc yếu tố nguy cơ. Chị H hoàn toàn bất ngờ khi người ta cho biết kết quả xét nghiệm của Anh P là VDRL (+) và THPA (+). Phần chị H, kết quả VDRL (+), còn THPA (-).

Câu 1. Xét nghiệm VDRL và TPHA đặc trưng cho bệnh lý nào? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Viêm khớp dạng thấp
- B. Hội chứng kháng thể kháng phospholipid
- C. Lupus ban đỏ hệ thống
- D. Giang mai

Câu 2. Ý nghĩa kết quả huyết thanh của chị H? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Chị H chưa từng bị mắc bệnh trên
- B. Chị H từng bị mắc bệnh trên nhưng đã khỏi tự nhiên
- C. Chị H đang ở giai đoạn tiềm ẩn của bệnh
- D. Chưa đủ dữ kiện xác định chính xác tình trạng nhiễm bệnh của chị H

Câu 3. Tên khoa học của loại vi khuẩn gây bệnh trên anh P? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Candida albicans
- B. Trichomonas vaginalis
- C. Treponema pallium
- D. Chlamydia trachomatis

Câu 4. Nguyên tắc điều trị bệnh căn trên bệnh nhân? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Điều trị sớm và đủ liệu
- B. Điều trị cho cả bạn tình
- C. Theo dõi định kỳ các xét nghiệm huyết thanh
- D. Sử dụng các biện pháp quan hệ an toàn

Câu 5. Loại kháng sinh đặc hiệu được sử dụng trên bệnh lý trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Quinolon
- B. Penicillin
- C. Cephalosporin

D. Sulfamid

Tình huống lâm sàng số 12.

Chị Quảng Thị V, 52 tuổi, hành kinh lần cuối cách nay 9 tháng, đến khám bệnh vì một nang ở buồng trứng. Phát hiện nang buồng trứng một cách tình cờ khi siêu âm bụng tổng quát ở phòng khám tư nhân. Chị thường xuyên có triệu chứng bốc hỏa. Kết quả siêu âm cho thấy: một nang buồng trứng có cấu trúc đơn thùy, $d = 40\text{mm}$, vỏ mỏng, không vách ngăn, các M-rules của IOTA (-), điểm màu 1 (B5), ROMA test nguy cơ ác tính thấp.

Câu 1. Chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U cơ năng của buồng trứng với xác suất cao ác tính
- B. U cơ năng của buồng trứng có khả năng cao lành tính
- C. U thực thể của buồng trứng với khả năng ác tính cao cần sinh thiết
- D. U thực thể của buồng trứng với khả năng lành tính chưa xác định

Câu 2. Các xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán khối u buồng trứng? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Siêu âm Doppler
- B. X-quang bụng không chuẩn bị
- C. X-quang tử cung – vòi trứng
- D. Sinh thiết

Câu 3. Với tình trạng trên bệnh nhân, bác sĩ nên chỉ định thực hiện thêm những dấu ấn sinh học bướu nào phù hợp? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. RMI

- B. AFP
- C. CA125
- D. CEA

Câu 4. U nang buồng trứng cần được phân biệt với bệnh gì? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. U xơ tử cung dưới thanh mạc có cuống
- B. Ú nước vòi tử cung
- C. Bàng quang ú nước tiểu
- D. Cổ chướng

Câu 5. Nguyên tắc chung của tiếp cận/quản lý các cấu trúc cơ năng của buồng trứng là gì? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Trong hầu hết trường hợp, chẩn đoán được thiết lập bằng cách loại trừ cấu trúc ác tính
- B. Nội dung quản lý thuộc vào nguyên nhân dẫn đến hình thành cấu trúc cơ năng đó
- C. Trong hầu hết trường hợp, việc can thiệp bằng nội tiết, chủ yếu là steroid, là cần thiết
- D. Chọc hút nang có thể là giải pháp cần thiết, cần nhắc lợi hại

Tình huống lâm sàng số 13.

Cô Doãn Thị Lan A., 32 tuổi, PARA 0000, đến khám bệnh Phương Châu vì hiếm muộn. Cô than phiền với bác sĩ rằng thường xuyên đau trần bụng dưới và đau khi thực hiện giao hợp sâu. Siêu âm phụ khoa cho thấy mỗi bên buồng trứng có hai nang phản âm kém đều dạng kính còi, đường kính thay đổi từ 40 – 50mm, vách rất dày, điểm màu 1 (B5). Cô A nói rằng cô đã biết có các nang này từ trước khi lấy

chồng, nhưng khi đó chúng nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, đường kính thay đổi từ 10 – 20mm. ROMA test cho kết quả nguy cơ cao là ác tính, nồng độ CA125 rất cao.

Câu 1. Khả năng chẩn đoán nào có thể phù hợp nhất cho cô A? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U cơ năng của buồng trứng
- B. U thực thể tân lập của buồng trứng có khả năng cao lành tính
- C. U thực thể tân lập của buồng trứng với khả năng ác tính không thể bỏ qua
- D. U thực thể không tân lập của buồng trứng

Câu 2. Tất cả những yếu tố sau đây đều gợi ý đến khả năng ác tính của u buồng trứng của cô A? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. U ở hai bên
- B. U cơ kèm theo bụng báng
- C. U có kích thước trên 20cm
- D. Có chồi sùi trong hoặc ngoài vỏ mỏng

Câu 3. Thăm khám cận lâm sàng có giá trị nhất của cô A? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Chụp tử cung vòi trứng
- B. Phết tế bào âm đạo
- C. Siêu âm Doppler
- D. X-quang bụng

Câu 4. Hướng xử trí phù hợp cho cô A? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Xạ trị
- B. Soi ổ bụng kết hợp giải quyết nguyên nhân

- C. Theo dõi thêm vài ba chu kỳ kinh nữa
- D. Mở cắt u nang buồng trứng hoặc bóc nang nếu được

Câu 5. Triệu chứng nào sau đây ít do u nang buồng trứng gây nên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Bụng to dần
- B. Rối loạn tiểu tiện
- C. Mất kinh
- D. Đau hoặc tức nặng bụng dưới

Tình huống lâm sàng số 14.

Chị B, 24 tuổi, PARA 0000, chuẩn bị kết hôn. Chị không có dấu hiệu lâm sàng nào đáng lo ngại nhưng một lần tình cờ đi khám phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Cần Thơ với giới khám tiền hôn nhân nữ thì bác sĩ chẩn đoán có khối u dạng nang cạnh tử cung với kích thước 5 x 4 x 5 cm, u có vách mỏng, chứa dịch và không có vách ngăn. Đồng thời, xét nghiệm CA 125, CEA cho kết quả nồng độ trong huyết thanh thấp.

Câu 1. Chẩn đoán sơ bộ phù hợp ở tình huống trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang cơ năng buồng trứng
- B. U nang thực thể buồng trứng
- C. U nang buồng trứng không tân lập ác tính cao
- D. U xơ tử cung ở dây chằng rộng

Câu 2. Hướng xử trí thích hợp đối với chị B trong trường hợp trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nội soi ổ bụng hoặc bóc nang nếu có thể
- B. Mở cắt buồng trứng
- C. Theo dõi thêm vài ba chu kỳ kinh nguyệt
- D. Cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ

Câu 3. Để phân biệt u nang buồng trứng trên chị B là lành tính hay ác tính thì bác sĩ sản khoa nên chỉ định thêm cận lâm sàng nào tiếp theo? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nội soi thám sát
- B. CT-scan 512 dãy
- C. Giải phẫu bệnh
- D. ROMA test

Câu 4. U nang buồng trứng ở chị B cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Có thai thật
- B. Ú dịch vòi tử cung
- C. Sảy thai không trọn
- D. Thai ngoài tử cung

Câu 5. Ở Việt Nam, đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thì các loại u nang thực thể nào sau đây hay gặp nhất? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. U nang bọc noãn
- B. U nang nhầy
- C. U nang bì
- D. U nang hoàng tuyến

Tình huống lâm sàng số 15.

Bà H, 45 tuổi, PARA 2002, đã mãn kinh. Bà đã được chẩn đoán u nang buồng trứng 10 năm trước nhưng chỉ theo dõi nếu có biến chứng gì khác thường, trong suốt thời gian này thỉnh thoảng kinh nguyệt không đều, hay đau bụng nhưng bà mua thuốc ngoài hiệu thuốc tây uống thuyên giảm nên không đi tái khám. Hiện tại, bụng bà to dần lên nên bà quyết định đi khám lại, bà được bác sĩ chẩn đoán có một khối u vùng chậu, kích thước 14 x 15 x 14 cm. Bà được bác sĩ chỉ định phẫu thuật giải quyết khối u, khi phẫu thuật vào trong bụng các bác sĩ quan sát thấy có u buồng trứng một bên kèm với di căn mạc nối lớn.

Câu 1. Khi tiến hành hồi cứu về ca bệnh của bà, các bác sĩ nghĩ nhiều về khối u nang buồng trứng 10 năm trước của bà thuộc loại? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang cơ năng khả năng ác tính cao
- B. U nang cơ năng khả năng ác tính thấp
- C. U nang thực thể có tỷ lệ ác tính cao
- D. U nang thực thể có xác suất ác tính thấp

Câu 2. Trước khi tiến hành vào phòng mổ, bà tha thiết mong có thêm 1 đứa con gái nữa vì ở nhà chỉ 2 đứa con trai. Như vậy, hướng xử trí phù hợp nhất mà các bác sĩ có thể chọn khi trên bàn mổ? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Sinh thiết mạc nối lớn và buồng trứng
- B. Cắt phần di căn mạc nối lớn, cắt tử cung bảo tồn
- C. Cắt phần di căn mạc nối lớn và cắt u buồng trứng
- D. Cắt toàn bộ mạc nối lớn, cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ

Câu 3. Đối với bà H, bác sĩ sản khoa nên tư vấn những gì phù hợp nhất cho bệnh nhân và người nhà trước và sau phẫu thuật? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Tỷ lệ sinh đẻ sau hậu phẫu là không cao
- B. Khuyến khích và động viên tinh thần cho người bệnh
- C. Cố gắng giữ lại khả năng sinh con cho sản phụ
- D. Hạn chế tối đa biến chứng trong phẫu thuật

Câu 4. Những ảnh hưởng của u nang buồng trứng trên thai kỳ bao gồm những nguyên nhân sau đây? *Chọn một câu sai:*

- A. Vô sinh
- B. U tiền đạo
- C. Nhau bong non
- D. Sảy thai

Câu 5. Biến chứng nguy hiểm nhất của u nang buồng trứng trên bệnh nhân có thai là gì? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang buồng trứng xoắn
- B. Vỡ nang buồng trứng
- C. Ung thư hoá
- D. Nang chèn ép vào tiểu khung

Tình huống lâm sàng số 16.

Cô Cao Minh N, 31 tuổi, đến bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ khám vì có thai 12 tuần. Tiền căn: không ra máu âm đạo, không đau trần bụng. Khám thấy có một bướu dạng nang cạnh trái tử cung, kích thước # 11 – 14cm, không đau, bề mặt u không sần sùi.

Câu 1. Hướng xử trí phù hợp của cô N? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Mở bụng hoặc nội soi, dùng nội tiết và giảm co
- B. Theo dõi đến cuối thai kỳ
- C. Mở cắt tử cung nguyên khối
- D. Điều trị bằng utrogestan

Câu 2. Nguy cơ chủ yếu của u nang buồng trứng trên thai kỳ của cô N là gì?

Chọn câu đúng nhất:

- A. Nguy hiểm cho mẹ
- B. Nguy hiểm cho con
- C. Nguy hiểm cho con nhiều hơn cho mẹ
- D. Nguy hiểm cho mẹ nhiều hơn cho con

Câu 3. Đối với trường hợp cô N thì khi mang thai, u nang buồng trứng có thể trở thành bệnh lý thứ phát nguy hiểm nhất của bệnh lý nào sau đây? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Nhau bong non
- B. Nhau tiền đạo
- C. Vô sinh
- D. Thai ngoài tử cung

Câu 4. Thông thường, nếu là khối u nang buồng trứng cơ năng kết hợp với có thai thì khối u sẽ biến mất khi tuổi thai đạt bao nhiêu tuần? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 8
- B. 12
- C. 15

D. 18

Câu 5. Nếu quyết định phẫu thuật u nang buồng trứng cho cô N thì phương pháp gây mê tốt nhất có thể chọn lựa ở bệnh nhân trên là? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Gây tê tuỷ sống
- B. Gây tê ngoài màng cứng
- C. Gây mê toàn thân
- D. Gây tê tại chỗ

Tình huống lâm sàng số 17.

Chị Thạch Thị T, 30 tuổi, PARA 1001, đến bệnh viện khám bệnh vì rong huyết kéo dài. Khám thực hiện không phát hiện gì bất thường, nhưng trên siêu âm phát hiện có u nang buồng trứng phải, kích thước 44mm, thành mỏng, chứa dịch trong, ít di động.

Câu 1. Hướng điều trị thích hợp cho chị T? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Theo dõi trong vòng 1 tháng
- B. Chọc hút nang qua đường bụng
- C. Mổ cắt u nang buồng trứng
- D. Cho vòng kinh nhân tạo trong 3 tháng

Câu 2. Về mặt giải phẫu học, đối với trường hợp chị T thì u nang buồng trứng phải có thể nhầm lẫn với bệnh lý nào sau đây? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Abscess ruột thừa
- B. Lách to độ IV
- C. Tử cung đôi

D. Bàng quang ú nước

Câu 3. Để xác định u nang buồng trứng tiến triển hay thoái triển, đối với chị T nói riêng và tất cả chị em phụ nữ Việt Nam nói chung thì cán bộ y tế nên căn dặn điều quan trọng gì? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nếu thấy đau bụng sau khám phải đi khám lại ngay
- B. Khám phụ khoa định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ
- C. Nếu thấy khó tiểu, đại tiện khó phải đi khám bác sĩ
- D. Nếu thấy đau trần bụng dưới thì nên đi khám

Câu 4. Tỷ lệ ung thư hoá của u nang buồng trứng nào cao nhất? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang tiết dịch nhầy
- B. U nang tiết dịch trong
- C. U nang bì
- D. U nang hoàng thể

Câu 5. Nếu u nang buồng trứng của chị T là thực thể thì đặc điểm của loại u đó như thế nào? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Có tổn thương thực thể tại buồng trứng
- B. Tiến triển từ từ
- C. Không tự khỏi và tồn tại kéo dài
- D. Có thể trở nên ác tính

Tình huống lâm sàng số 18.

Chị M, 27 tuổi, chưa lập gia đình, đến bệnh viện khám vì mất kinh gần một tháng nay, sau đó rong huyết 5 ngày. Khám toàn trạng ghi nhận: thể trạng trung bình, không viêm nhiễm âm đạo – âm hộ, siêu âm thấy có một nang buồng trứng bên trái, kích thước # 4,5cm, dịch trong, không vách ngăn, vỏ mỏng, tử cung bình thường, niêm mạc tử cung dày lên 16mm, β -hCG huyết thanh (-).

Câu 1. Chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang cơ năng buồng trứng
- B. U nang thực thể buồng trứng ác tính cao
- C. U nang thực thể buồng trứng ác tính thấp
- D. U xơ tử cung dưới phúc mạc

Câu 2. Phân loại u nang buồng trứng dựa vào các dữ kiện đề bài? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang bọc noãn
- B. U nang hoàng thể
- C. U nang tiết dịch trong
- D. U lạc nội mạc tử cung

Câu 3. Đối với chị M nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung, thì độ tuổi thường gặp u nang buồng trứng là? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. < 20 tuổi
- B. Tuổi sinh đẻ
- C. Mãn kinh
- D. > 65 tuổi

Câu 4. Chẩn đoán phân biệt loại u nang buồng ở chị M với bệnh lý nào sau đây?

Chọn nhiều câu đúng:

- A. U nang hoàng thể
- B. U nang bọc noãn
- C. U lạc nội mạc tử cung
- D. U nang tiết dịch trong

Câu 5. Hướng xử trí phù hợp cho chị M? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Theo dõi và điều trị bằng thuốc nội tiết
- B. Lóc u nang, chừa lại mô lành
- C. Cắt tử cung bán phần và hai phần phụ
- D. Cắt tử cung toàn phần và hai phần phụ

Tình huống lâm sàng số 19.

Chị Vương Thị Ngọc P, 30 tuổi, biết mình bị vô sinh sau khi lấy chồng được 2 năm. Hôm nay, chị đến khám bệnh viện với lý do là thấy bụng to lên nhanh, khám thực thể phát hiện phần phụ bên phải có khối u kích thước # 11cm. Siêu âm quan sát u ghi nhận: bờ rõ, nhiều thủy, trong lòng chứa dịch không trong, có phản âm kém, β -hCG huyết thanh (-).

Câu 1. Chẩn đoán phù hợp nhất trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang tiết dịch trong
- B. U nang tiết dịch nhầy
- C. U nang bì
- D. U nang hoàng tuyến

Câu 2. Hãy cho biết, tỉ lệ loại u nang của bệnh nhân trên chiếm bao nhiêu phần trăm tổng các loại u nang cùng loại? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Khoảng 1%
- B. Khoảng 10%
- C. Khoảng 30%
- D. Khoảng 60%

Câu 3. Đối với trường hợp của chị P, khám thấy bụng to lên bất thường, do đó ta cần chẩn đoán phân biệt với bệnh lý nào sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Thận ứ nước
- B. U xơ cơ tử cung có cuống
- C. Bàng quang ứ nước tiểu
- D. Đa thai, đa ối

Câu 4. Hướng xử trí phù hợp trên chị P? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Bóc u nang, cẩn thận nút u
- B. Xẻ dọc buồng trứng trái
- C. Chỉ cắt bỏ phần phụ chứa u
- D. Cắt tử cung và hai phần phụ

Câu 5. U nang buồng trứng trên chị P, có thể vỡ gây nên tình trạng bệnh lý nào sau đây? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Xoắn nang
- B. Xuất huyết trong
- C. Viêm phúc mạc giả nhầy
- D. Thoái hoá ung thư

Tình huống lâm sàng số 20.

Cô Nguyễn Thị Thuý A, 40 tuổi, PARA 2002, cô đến khám bệnh với tình trạng thấy bụng to lên và tự sờ thấy một khối u vùng hạ vị hơi lan lên bụng, qua thăm khám thực thể ghi nhận u phần phụ bên phải có kích thước # 16cm, trên siêu âm thấy một khối u phần phụ bên trái có kích thước 10 x 9cm, trong lòng nang chứa dịch trong, vách nang mỏng, echo trống.

Câu 1. Chẩn đoán sơ bộ nào phù hợp nhất trên cô A? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang cơ năng buồng trứng khả năng ác tính cao
- B. U nang cơ năng buồng trứng khả năng ác tính thấp
- C. U nang thực thể buồng trứng khả năng ác tính cao
- D. U nang thực thể buồng trứng khả năng ác tính thấp

Câu 2. Dựa vào thăm khám lâm sàng và chỉ định cận lâm sàng đã thực hiện ở trên hãy cho biết loại u nang được nghĩ đến nhiều nhất của cô A? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang tiết dịch nhầy
- B. U nang tiết dịch trong
- C. U nang bì
- D. U nang bọc noãn

Câu 3. Chẩn đoán phân biệt u nang buồng trứng lan lên vùng bụng của cô A, chưa phù hợp với bệnh lý nào sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Tử cung có thai trên 2 tháng
- B. Dịch cổ chướng
- C. U mạc treo
- D. Thai ngoài tử cung

Câu 4. Phương hướng thích hợp nhất để xử trí u nang buồng trứng của bệnh nhân?

Chọn câu đúng nhất:

- A. Bóc tách nang
- B. Chọc hút nang bảo tồn buồng trứng
- C. Mở cắt u nang và buồng trứng 2 bên
- D. Mở cắt bỏ u nang và gửi giải phẫu bệnh

Câu 5. Tỷ lệ ung thư hoá cao nhất đối với u nang buồng trứng trên bệnh nhân?

Chọn nhiều câu sai:

- A. U tiết dịch nhầy cao hơn u tiết dịch trong
- B. U tiết dịch trong cao hơn u tiết dịch nhầy
- C. U bì cao hơn u tiết dịch nhầy
- D. U tiết dịch trong bằng với u bì

Tình huống lâm sàng số 21.

Chị Lê Minh C, 26 tuổi, chưa lập gia đình, kinh nguyệt đều đặn, được chuyển viện trong tình trạng đau bụng vùng hạ vị dữ dội, vã mồ hôi và nôn ói. Khám bụng thấy có phản ứng thành bụng, sờ có một khối u bên phải kích thước # 8 - 10cm, di động hạn chế, không ra máu âm đạo, chạm vào đau. Trên siêu âm: khối u nang buồng trứng bên phải, d # 9cm, echo hỗn hợp, không đồng nhất và có bóng lưng. Định lượng β -hCG (-).

Câu 1. Chẩn đoán sơ bộ nào sau đây phù hợp với tình trạng bệnh lý trên? *Chọn*

câu đúng nhất:

- A. U nang buồng trứng xoắn
- B. Thai ngoài tử cung đã vỡ

- C. Viêm ruột thừa cấp
- D. Viêm phần phụ

Câu 2. Dựa vào những biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng trên bệnh nhân, anh/chị hãy nghĩ nhiều đến loại u nang nào đối với bệnh cảnh ở trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang tiết dịch trong
- B. U nang hoàng tuyến
- C. U nang bì
- D. U nang tiết dịch nhầy

Câu 3. Biến chứng hay gặp nhất của loại u nang buồng trứng trên chị C? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Xoắn nang
- B. Xuất huyết nang
- C. Vỡ nang
- D. Nhiễm trùng cấp

Câu 4. Thành phần nào có trong loại u nang buồng trứng trên chị C? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Tóc
- B. Răng
- C. Tổ chức bã đậu
- D. Tuyến mồ hôi

Câu 5. Loại u nang nào sau đây có nguồn gốc từ tế bào mầm? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U nang tiết dịch trong
- B. U nang tiết dịch nhầy
- C. U nang bì
- D. U nang hoàng thể

Tình huống lâm sàng số 22.

Cô Trương Thị Hằng N, 30 tuổi, PARA 0010, tiền căn đã cắt 1 vòi dẫn trứng do thai ngoài tử cung. Lần này, cô mang thai nhờ phương pháp IVF tại bệnh viện Phương Châu. Cô được chuyển phôi cách đây đúng 4 tuần. Sau chuyển phôi 2 tuần bà N đã có kết quả định hCG = 120 mIU/mL. Cô N không đau bụng, không ra huyết âm đạo. Hôm nay, cô N được siêu âm, ghi nhận lớp nội mạc tử cung dày lên # 8mm, không thấy hình ảnh túi thai trong buồng tử cung, không thấy khối cạnh tử cung. Lúc này, cô N được cho định lượng hCG với kết quả là 846 mIU/mL.

Câu 1. Kết luận nào sau đây phù hợp cho cô N? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thai kỳ đang tiến triển bình thường
- B. Thai ngưng tiến triển
- C. Thai chưa xác định vị trí
- D. Sảy thai trọn

Câu 2. Từ những dữ kiện ở đề bài, anh/chị hãy cho biết chẩn đoán sơ bộ có thể nghĩ đến nhiều nhất cho bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thai chết lưu
- B. Sảy trai trọn
- C. Thai ngoài tử cung
- D. Suy thai trường diễn

Câu 3. Đề bài có nhắc đến câu “Cô mang thai nhờ phương pháp IVF tại bệnh viện”. Hỏi IVF là phương pháp gì? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Bơm tinh trùng vào tử cung
- B. Thụ tinh trong ống nghiệm
- C. Tiêm tinh trùng vào bào tương noãn
- D. Trưởng thành noãn trong ống nghiệm

Câu 4. Nếu quyết định điều trị bằng MTX trên bệnh nhân, thì cần theo dõi sau điều trị MTX chủ yếu dựa vào? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Siêu âm Doppler
- B. Thăm khám lâm sàng
- C. β -hCG huyết thanh
- D. Nồng độ progesterone và estrogen

Câu 5. Tương lai sản khoa của cô N sau khi điều trị bệnh căn trên vì nếu đã bị 1 lần thì nguy cơ tăng lên 7 – 13 lần trong lần mang thai kế tiếp? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. 50 – 80% thai trong tử cung
- B. 12 – 25% thai ngoài tử cung
- C. 20 – 35% thai trong tử cung
- D. 60 – 75% thai ngoài tử cung

Tình huống lâm sàng số 23.

Bà Mai Đoan T, 42 tuổi, PARA 2002, đến khám vì kinh kéo dài. Đã có con nhỏ được 10 tuổi, con lớn 14 tuổi. Sau sanh, bà T có chu kỳ kinh đều, 28 ngày, dài 3 ngày, lượng kinh vừa. Từ một năm sau đó, thời gian mỗi lần hành kinh dài hơn, lên

đến 7 – 8 ngày, dù chu kỳ kinh vẫn 28 ngày, đều và lượng kinh hằng ngày cũng nhiều hơn đôi chút. Khám âm đạo thấy tử cung hơi to, chắc, di động. Siêu âm ghi nhận một khối u xơ cơ tử cung loại FIGO 2, $d = 3\text{cm}$. Bà T cho hay bà đã quyết định không muốn sanh con nữa và cũng không muốn ảnh hưởng tới sinh hoạt vợ chồng.

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết, phương pháp ưu tiên được lựa chọn cho vấn đề chảy máu của bà T là? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. HIFU – MRI (Sóng siêu âm tần số cao có cộng hưởng từ hướng dẫn)
- B. UAE (Thuyên tắc động mạch tử cung chọn lọc)
- C. COCs (Tránh thai nội tiết phối hợp)
- D. Điều hoà chọn lọc thụ thể progesterone

Câu 2. Trong các biến chứng liên quan đến u xơ cơ tử cung của bà T, thì biến chứng nào hiếm gặp nhất? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Chèn ép bàng quang
- B. Đè niệu quản
- C. Xoắn
- D. Thoái hoá ác tính

Câu 3. Theo phân loại FIGO trong u xơ cơ tử cung thì FIGO 2 của bà T có ý nghĩa gì? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. U xơ hoàn toàn nằm trong cơ tử cung
- B. U xơ dưới thanh mạc, có cuống
- C. U xơ có cuống, trong buồng tử cung
- D. U xơ $\leq 50\%$ trong buồng tử cung

Câu 4. Thuốc “nhắm trúng mục đích” có thể được sử dụng trên bà T? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Oxytocin
- B. Buscopan
- C. Progestins
- D. Mifepristone

Câu 5. U xơ cơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở khoảng 50 – 70% phụ nữ có độ tuổi? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 20 – 40
- B. 30 – 50
- C. 40 – 60
- D. 50 – 70

Tình huống lâm sàng số 24.

Chị Lê Thị A, 28 tuổi, PARA 1001, ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối là 20/5/2020, kinh đều 28 ngày. Đi khám thai định kỳ tại cơ sở y tế có chuyên khoa phụ sản. Hôm nay, khám ghi nhận bề cao tử cung 16cm, tim thai (+). Siêu âm ghi nhận SDP < 1cm. Các thông số sinh trắc của thai tương ứng với 50th của tuổi thai 16 tuần.

Câu 1. Anh/chị hãy cho biết giả sử quá trình thụ tinh diễn ra bình thường, thì theo lý thuyết thời gian thụ tinh của chị A là? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 30/5/2020
- B. 3/6/2020
- C. 7/6/2020
- D. 11/6/2020

Câu 2. Hãy tính ngày dự sanh của chị A dựa vào dữ kiện phía trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 16/2/2021
- B. 19/2/2021
- C. 21/2/2021
- D. 24/2/2021

Câu 3. Hãy tính tuổi thai hiện tại của chị A dựa vào bề cao tử cung? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 4 tuần
- B. 5 tuần
- C. 6 tuần
- D. 7 tuần

Câu 4. Chỉ số SDP có ý nghĩa gì? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Chỉ số ối
- B. Dung tích lượng nước ối
- C. Độ sâu xoang ối lớn nhất
- D. Độ sâu xoang ối nhỏ nhất

Câu 5. Chỉ số SDP < 1cm nói lên điều gì? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Thiếu ối
- B. ối cận biên
- C. ối bình thường
- D. Đa ối

Tình huống lâm sàng số 25.

Chị Cao Thị P, 30 tuổi, PARA 3003, hiện đang mang thai 37 tuần 3 ngày. Chị đi khám thai định kỳ đầy đủ, các thông tin lâm sàng và cận lâm sàng đều bình thường. Hôm qua, chị cảm thấy thai giảm cử động so với các ngày trước.

Câu 1. Thái độ xử trí tiếp theo cho chị P là gì? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Non-stress test
- B. Khảo sát thể tích ối
- C. Contraction Stress Test
- D. Trắc đồ sinh vật lý biến đổi

Câu 2. Khi tiến hành đo độ sâu xoang ối lớn nhất ghi nhận # 6cm. Với kết quả trên, ta có thể hiểu như thế nào cho phù hợp với bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Thiếu ối
- B. Ới cận biên
- C. Ới bình thường
- D. Đa ối

Câu 3. Khi tiến hành theo dõi đánh giá sức khỏe thai nhi của chị P trong việc khảo sát thể tích nước ối thì thông số nào là lựa chọn tốt hơn hết? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. AFI
- B. SDP
- C. BPP
- D. CST

Câu 4. Trắc đồ sinh vật lý biến đổi có thể dùng theo dõi sức khỏe thai nhi trên chị P bao gồm những thành phần sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Non-stress test
- B. Thẻ tích nước ối
- C. Contraction stress test
- D. Chỉ số Bishop

Câu 5. Chị P được tiến hành đo trắc đồ sinh vật lý biến đổi ghi nhận kết quả là BPP bình thường. Vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào trên thực tiễn? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Non-stress test đáp ứng
- B. Thẻ tích nước ối bình thường
- C. Contraction stress test đáp ứng
- D. Chỉ số Bishop > 8 điểm

Tình huống lâm sàng số 26.

Cô Mai Thị H, 34 tuổi, PARA 1001, chuyên dạ sanh, thai 34 tuần, ngôi chỏm. Lúc vào viện khám lâm sàng ghi nhận ối đã vỡ, nước ối trắng đục, cơn cơ tử cung 4 cơn/10 phút.

Câu 1. Theo WHO 2014 thì thai 34 tuần của cô H được đánh giá ở mức độ nào của tình trạng sinh non? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Sinh cực non
- B. Sinh rất non
- C. Sinh non trung bình
- D. Sinh non muộn

Câu 2. Bệnh nhân được thăm khám sản khoa ghi nhận:

- Độ mở cổ tử cung 4cm
- Độ xoá cổ tử cung 70%
- Độ lọt của thai -2
- Mật độ cổ tử cung vừa
- Hướng cổ tử cung trung gian

Từ những dữ kiện trên, anh/chị hãy đánh giá chỉ số Bishop của cô H để xem xét khả năng khởi phát chuyển dạ trong tình huống trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 5 điểm
- B. 6 điểm
- C. 7 điểm
- D. 8 điểm

Câu 3. Chông chỉ định nghiệm pháp lọt ngôi chỏm trên cô H? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Thai suy
- B. Các ngôi không phải ngôi chỏm
- C. Có sẹo mổ cũ ở tử cung
- D. Bất tương xứng đầu chậu

Câu 4. Để tiến hành khởi phát chuyển dạ bằng Oxytocin theo phác đồ liều thấp cho sản phụ bằng cách pha 5 đơn vị Oxytocin trong 49ml Glucose 5%, sử dụng ED. Anh/chị hãy cho biết, liều tối đa có thể dùng trên sản phụ? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 10 mIU/phút
- B. 20 mIU/phút
- C. 30 mIU/phút
- D. 40 mIU/phút

Câu 5. Khả năng nào có thể xảy ra trên cô H? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Chuyển dạ bình thường
- B. Tổn thương tầng sinh môn
- C. Trẻ ngạt do cơn co cường tính
- D. Băng huyết sau sanh do òr tử cung

Tình huống lâm sàng số 27.

Cô Thạch M, 35 tuổi, PARA 0030, với 3 lần sảy thai liên tiếp. Hiện tại tuổi thai là 33 tuần vô kinh. Nửa đầu của thai kỳ diễn ra bình thường. Có điều, 2 tuần trước đây, cô bị ra máu âm đạo lần đầu tiên, đỏ tươi, khoảng 1 băng vệ sinh rồi tự cầm. Hôm nay, cô thấy ra máu lại, với tính chất và số lượng tương tự, nên đến khám tại bệnh viện. Khám lâm sàng ghi nhận không còn ra máu âm đạo, sinh hiệu ổn, không có cơn co tử cung. Kết quả siêu âm ghi nhận: nhau tiền đạo, nhau bám mặt sau thân tử cung, lan ra trước, che lấp hoàn toàn lỗ cổ tử cung.

Câu 1. Dựa vào những dữ kiện đề bài, anh/chị hãy cho biết đây là loại nhau tiền đạo nào? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nhau bám thấp
- B. Nhau bám mép
- C. Nhau tiền đạo bán trung tâm
- D. Nhau tiền đạo trung tâm

Câu 2. Cận lâm sàng nào sau đây là phương tiện khảo sát được lựa chọn cho mục đích thực hiện chẩn đoán nhau tiền đạo, đồng thời chi phí và giá thành hợp lý nhất cho cô M? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Siêu âm ngả bụng

- B. Siêu âm ngả âm đạo
- C. Chụp cắt lớp vi tính
- D. MRI

Câu 3. Máu chảy ra ngoài trong nhau tiền đạo của cô Thạch M là máu của ai?

Chọn nhiều câu sai:

- A. Máu thai nhi
- B. Máu sản phụ
- C. Máu sản phụ và máu thai nhi
- D. Rối loạn đông máu

Câu 4. Hướng xử trí phù hợp sản phụ M? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Dùng betamimetic dự phòng xuất hiện cơn co tử cung
- B. Dùng progesterone dự phòng xuất hiện cơn co tử cung
- C. Dùng corticosteroid trưởng thành phổi cho thai nhi
- D. Nằm nghỉ ngơi tại giường, theo dõi diễn tiến

Câu 5. Nguyên nhân chính xuất huyết tử cung bất thường trong bệnh lý của cô Thạch M xảy ra ở giai đoạn nào của thai kỳ? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. 3 tháng đầu của thai kỳ
- B. 3 tháng giữa của thai kỳ
- C. 3 tháng cuối của thai kỳ
- D. Tất cả đều đúng

Tình huống lâm sàng số 28.

Chị Hoàng Thị Cẩm H, 25 tuổi, PARA 0000. Chu kỳ kinh 28 ngày, đều. Ngay khi có trễ kinh, chị thử định tính hCG (+). Khoảng 3 tuần sau, chị có đau bụng kèm ra huyết âm đạo đen sậm, lượng ít nên đến khám bệnh. Chị được định lượng hCG huyết thanh với nồng độ = 800 mIU/L và siêu âm với kết quả hình ảnh echo trống ở ngay giữa lòng tử cung, viền mỏng, $d = 10 \times 2 \times 2$ mm, không có bất thường 2 hai phần phụ.

Câu 1. Dựa vào những dữ kiện được nêu ở đề bài, chẩn đoán sơ bộ nào phù hợp với tình trạng bệnh lý của chị H? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Nhau bong non
- B. Thai trứng
- C. U nang buồng trứng
- D. Thai ngoài tử cung

Câu 2. Cần chẩn đoán phân biệt bệnh lý của chị H với các bệnh lý sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A. Doạ sẩy thai
- B. U xơ tử cung
- C. Thai lưu
- D. Suy thai

Câu 3. Tiêu chuẩn vàng để phân loại bệnh căn trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Siêu âm
- B. Định lượng β -hCG

- C. Giải phẫu bệnh
- D. Chụp cắt lớp vi tính

Câu 4. Hướng xử trí phù hợp cho tình huống trên? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Cắt buồng trứng và hai phần phụ
- B. Cắt tử cung bán phần và hai phần phụ
- C. Nạo hút sạch trứng
- D. Thất động mạch tử cung

Câu 5. Sau khi đã tiến hành xử trí cho bệnh nhân, yếu tố quan trọng nhất để đánh giá và tiên lượng bệnh cho bệnh nhân là gì? *Chọn nhiều câu sai:*

- A. Nồng độ progesterone
- B. Nồng độ AMH
- C. Nồng độ β -hCG
- D. Nang hoàng thể

Tình huống lâm sàng 29.

Chị X, 22 tuổi, đến khám vì đang mang thai 30 tuần (theo siêu âm lúc thai 8 tuần). Khám ghi nhận huyết áp 140/90 mmHg, mạch 82 lần/phút, phù toàn thân. Đạm niệu thử bằng que Dip-stick (+++), 5gram/L. Bề cao tử cung 30cm, ngôi ngược, cơn co (-), tim thai 150 nhịp/phút, cổ tử cung đóng, dày, chún sau.

Câu 1. Chẩn đoán phù hợp trên bệnh nhân? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Tiền sản giật không có dấu hiệu nặng
- B. Tiền sản giật có dấu hiệu nặng
- C. Suy thận cấp trước thận

D. Chưa đủ dữ kiện để chẩn đoán

Câu 2. Những biến chứng có thể xảy ra trên chị X? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A.** Thai lưu
- B.** Sản giật
- C.** Thai kém phát triển trong tử cung
- D.** Nhau cài răng lược

Câu 3. Hội chứng HELLP là một biến chứng nặng của bệnh lý trên. Nó thể hiện cho sự tổn thương nội mô đa cơ quan và đặc trưng bởi các đặc điểm sau? *Chọn câu SAI:*

- A.** Tán huyết
- B.** Tăng men gan
- C.** Giảm tiểu cầu
- D.** Tăng hồng cầu

Câu 4. Những thuốc chống tăng huyết áp trên thai kỳ trong tiền sản giật có thể sử dụng cho chị X gồm có những loại sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A.** Hydralazin
- B.** Mythyldopa
- C.** Labetalol
- D.** Captopril

Câu 5. Mục đích của việc sử dụng Magnesium sulfat trong điều trị tiền sản giật? *Chọn câu đúng nhất:*

- A.** Ngăn chặn cơn co giật

- B. Dự phòng cơn co giật
- C. Ổn định chức năng thận
- D. Hỗ trợ hạ áp an toàn

Tình huống lâm sàng số 30.

Bà Chu Thị H, 30 tuổi, PARA 0000, đang theo dõi chuyển dạ, thai kỳ bình thường, tuổi thai 40 tuần theo siêu âm, chuyển dạ nguy cơ thấp. Đã được gây tê ngoài màng cứng giảm đau sản khoa. Hiện tại, sinh hiệu ổn. Cổ tử cung mở trọn. Ngôi chỏm đã lọt, hiện ở kiểu thể chỏm chậu phải sau, bất đối xứng đầu chậu, vị trí +1, chông xương [+++]. Ối đã vỡ hoàn toàn, nước ối xanh ra theo tay khi khám. Khung chậu bình thường theo sản khoa.

Câu 1. Hướng xử trí thích hợp nhất có thể? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Chờ đầu xuống thấp
- B. Giúp sanh chủ động
- C. Mổ sanh ngay
- D. Đánh giá Bishop trước khi sanh

Câu 2. Độ lọt của sản phụ H ở vị trí +1, vậy độ lọt Delle lấy mốc vị trí 0 tương ứng với mức nào? *Chọn câu đúng nhất:*

- A. Ngang hai gai hông
- B. Ngang hai gai chậu trước trên
- C. Ngang lộ bịt
- D. Ngang mào chậu

Câu 3. Đối với sản phụ H, để được tiến hành gây tê ngoài màng cứng để giảm đau trong chuyển dạ thì cần đạt phân độ nào theo ASA (Hội gây mê Hồi sức Hoa kỳ)?

Chọn nhiều câu đúng:

- A.** ASA I
- B.** ASA II
- C.** ASA III
- D.** ASA IV

Câu 4. Kỹ thuật gây tê ngoài màng cứng để giảm đau trong chuyển của chị H thường tiến hành ở vị trí nào sau đây? *Chọn nhiều câu đúng:*

- A.** L1 – L2
- B.** L2 – L3
- C.** L3 – L4
- D.** L4 – L5

Câu 5. Điểm mốc của ngôi chỏm là? *Chọn câu đúng nhất:*

- A.** Thóp sau
- B.** Đỉnh xương cùng
- C.** Mỏm vai
- D.** Cằm

ĐÁP ÁN MINH HOẠ

NỘI DUNG	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5
THLS 1	A	A/C/D	B	C	B
THLS 2	C	A/B/C/D	B	B	C
THLS 3	B	A/B/C	A	A/B/C	A/B
THLS 4	C	A/B	A/B/C/D	A/B/C/D	B
THLS 5	C	C	A/B/C	B	C
THLS 6	A	B	A/B/C/D	B/C/D	B
THLS 7	A	A	D	A/B/C	A/B/C/D
THLS 8	A	B/C	A/C/D	A/B/D	B
THLS 9	D	A/B/C/D	D	B/D	C
THLS 10	B	B/C	B	C/D	B
THLS 11	A/B/C	D	C	A/B/C/D	B
THLS 12	B	A/B/C	B/C/D	A/B/CD	A
THLS 13	D	A/B/D	A/B/D	D	C
THLS 14	A	C	C	A/B/D	A/D
THLS 15	C	D	A/B	C	C
THLS 16	A	D	A/C/D	D	A/B/D
THLS 17	D	B/C/D	B	B	A/C/D
THLS 18	A	A	B	A/C/D	B/C/D
THLS 19	B	D	A/B/C	A	A/B/D
THLS 20	C	B	A/B/C	D	A/C/D
THLS 21	A	C	B/C/D	A/B/C	C
THLS 22	C	C	A/C/D	C	A/B

THLS 23	D	A/B/C	D	C/D	B
THLS 24	B	D	B	A/B/D	B/C/D
THLS 25	D	C	B	A/B	A/B
THLS 26	A/B/C	C	A/B/C/D	C	D
THLS 27	D	B	A/C/D	C/D	C
THLS 28	B	A/B/C	C	C	A/B/D
THLS 29	B	A/B/C	D	A/B/C	B
THLS 30	C	A	A/B	C/D	A

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phác đồ điều trị Sản phụ khoa

Bệnh viện Từ Dũ

NXB Thanh Niên (2019)

2. Âu Nhật Luân – Võ Minh Tuấn – Vương Thị Ngọc Lan – Nguyễn Hồng Hoa

Bài giảng Sản khoa - Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

NXB Y học (2020)

3. PGS.TS Trương Quang Vinh

Giáo trình Sản khoa – Đại học Y dược Huế

NXB Y học (2016)

4. GS.TS Cao Ngọc Thành – PGS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

Giáo trình Phụ khoa – Đại học Y dược Huế

NXB Y học (2016)